

Especies de caza mayor. Súidos: el jabalí (*Sus scrofa*)



Alfonso San Miguel Ayanz

Dep. Sistemas y Recursos Naturales.- E.T.S. Ing. Montes F y MN.- Univ. Politécnica de Madrid
alfonso.sanmiguel@upm.es - <http://www2.montes.upm.es/dptos/dsrn/SanMiguel/index.htm>



POLITÉCNICA



Jabalí (*Sus scrofa* L.)


Características generales

Etimología: El cerdo del monte

Biometría (España):

- Machos adultos: hasta 120 (150) kg
- En Rusia y Polonia superan los 200 (300) kg
- Hembras adultas: hasta 60-80 kg

- Buen trofeo (boca) en machos: 3-6 años (según edad y nutrición)



http://es.wikipedia.org/wiki/Sus_scrofa

- No son raros los cruces con cerdo



Ecología y etología:

- Gran valencia ecológica:
desde 2400 m en Pirineos hasta espartizales y dunas
Necesita refugio (vegetación leñosa densa)
- Desapareció de parte de la Península Ibérica, pero la ha recolonizado con enorme rapidez e intensidad
- Se ha convertido en un problema (sanitario, tráfico, daños en cultivos, predación, hozaduras, invasión de zonas urbanas...) por su ubicuidad y abundancia.
- Machos adultos solitarios o grupo pequeño (escudero)
- Piaras de hembras y jóvenes
- Baños de barro
- Hozaduras: perturbaciones
- Riesgo sanitario: tuberculosis, brucelosis, Aujeszky,...
y ahora peste Porcina Africana en E de Europa



Alimentación:

- Omnívoro. Gran importancia bellotas y bulbos
- Predador (gazapos, huevos, pollos,...)
- Cebo con maíz (problemas)



Reproducción:

- Especie poligínica: un macho - varias hembras
- Hembras poliéstricas estacionales
- Madurez sexual: 10-11 meses (\cong 30 kg)
- Gestación: 4 meses. Posible 2 partos/año
- Crías (rayones)/parto: (2) 4-5 (8) función de peso y condición corporal
- Celo habitual: octubre-diciembre
- Partos enero-abril (puede haber otro en otoño)
- Fertilidad: 80-90% adultas;
 \cong 30% menores de 1 año
- Lactación: 3-4 meses



Dinámica poblacional:

- Estratega de la r: gran prolificidad
- Impresionante crecimiento poblacional en las últimas 5 décadas
- La población puede duplicarse (o más) cada año
- Mortalidad natural en rayones: muy variable media $\cong 20\%$
- Mortalidad en dos primeros años $> 80\%$
- Media de edad en monterías: $\cong 2$ años
- Dinámica poblacional regulada por alimento (bellota) y clima (sequía)
- Predación por lobo (águila real, buho real, perro)
- Crecimiento poblacional anual (posibilidad) $\Rightarrow 100\%$ o mayor
- Densidades: 1- 13 ind/km²
- Proliferación de cercones con grandes densidades



Referencias bibliográficas y enlaces web

- Ballesteros, F. 1998. Las especies de caza en España. Biología, ecología y conservación. Ed. Estudio y Gestión del Medio. Oviedo
- Blanco, J.C. 1998. Mamíferos de España. Tomo II. Ed. Planeta. Barcelona
- Fernández-Llario, P. 2006. Jabalí - *Sus scrofa* Linnaeus 1758. Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles. <http://www.vertebradosibericos.org/mamiferos/pdf/susscr.pdf>