

Ganado Ovino



Alfonso San Miguel Ayanz


Dep. Sistemas y Recursos Naturales.- E.T.S. Ing. Montes F y MN.- Univ. Politécnica de Madrid
alfonso.sanmiguel@upm.es -<http://www2.montes.upm.es/dptos/dsrn/SanMiguel/index.htm>



Megafauna de la Península Ibérica al final del Pleistoceno: -20.000 - -10.000 aBP



Capra pyrenaica



Mammuthus primigenius



Rangifer tarandus




Bison priscus



Equus ferus



Bos primigenius




Coelodontha antiquitatis



Dama dama


Características generales

- Ungulado. Rumiante = poligástrico. Bóvido. *Ovis aries*, *O. orientalis aries*
- Domesticación hace > 8.000 años en próximo Oriente
- Hembras poliéstricas estacionales. Otoño-Prim.
- Gestación 5 meses; 1-2 corderos/parto.
- Primera cubrición 9-12 meses.
- Vida reproductiva útil: 6-8 años; prolificidad: 1-1,4 (1,6)
- Recrío: corderas – borregas - ovejas
- Sincronización partos
- Lactación: 45 días (carne) (+ 80-180 días leche-queso)
- Corto periodo de necesidades nutritivas altas (ult 1/3 gestación y lactación)
- Dependencia de suplementación según orientación (carne/leche/mixta)
- Necesitan pastor (ahora se sustituye por valla, aunque no es lo mismo)
- Subvenciones a ganadería extensiva





Situación en el mundo, España y Europa



- Mundo: > 800 razas. Australia, N Zelanda, Rusia, China, India, Arg,...
- España es 2ª en cabaña y producción ovina en la UE



<http://www.magrama.gob.es/>

Ovino





Ovino de carne

- Tecnificación media – baja. Necesita pastor
- Lana: alto valor hasta década 1960, ahora precio bajo
- Con subvención europea en extensivo. Desacoplamiento parcial
- Trashumancia: antes mucho, ahora muy poco (transterminancia)
- Orientaciones: carne, leche, mixta
- 1 parto/año (otoño-primavera) – 3 partos/2 años, según orientación
- Razas autóctonas. Ahora se emplean las denominadas “precoces”: Ille de France, Fleischschaf, Landschaf, merino precoz, Berrinchon,..
- Dependencia de suplementación (menos en razas autóctonas)
- Calidad. Denominación de origen
- Cordero lechal (45 días), ternasco (45-90 días)
- Cordero de cebo (3-5 meses) y cordero pascual (4-8 meses)
- Disminución consumo de carne. Buen precio quesos
- Expectativas difíciles en extensivo, mejor para queso
- Reducción de nº de explotaciones. Rebaños: 500 – 1000(+) ovejas
- Pérdida de “cultura” ganadera. Cada vez menos ovino en el monte.

**Merina
pastando**



Lana de merina



Foto: M. Cabeza de Vaca

Servicios de regulación y culturales



- Pastadora, andadora
- Gregaria
- Apura mucho
- Precio corderos
- Concentración partos
- Predación: zorro, lobo, oso, ... Carroñeros

Lacha cara negra



Rubia del Molar, con mastín





Vasca bearnesa. Careo



Merina



Ahijado


Destete cordero 45 días



CEBO


Extensivo
(Sin o casi sin suplementación)


1 parto/año
(primavera u otoño)



Intensivo (no en cargas)
(más suplementación)

3 partos/ 2 años





El censo del sector ovino se reduce un 44% en España en los últimos 25 años, según Interovic

27 de octubre 2025



0 LIKES

COMENTARIOS
INHABILITADOS

IMPRIMIR

TAGS

GANADERÍA

IN

OVINO

Ovino de leche

- Aprox. 15% del ovino español es lechero.
- España es 3ª en Europa en leche de ovino
- Tecnificación media – alta
- Concentrados. Coste alimentación: 50-60% del total
- Alto valor añadido de la elaboración de queso
- Calidad. Denominación de origen: manchego, Idiazábal, Roncal, torta del Casar,...
- Exigencias de higiene y calidad: proximidad a zonas de ordeño
- Ordeño mecánico
- 1 parto/año o 3 partos/2 años, según orientaciones y regiones
- Lactación: duración 80-180 días y producción 0,8 – 1,5 (2) kg/día
- Lactación artificial de corderos: no siempre
- Razas autóctonas (manchega, churra, lacha, castellana y otras). Ahora a las tradicionales se unen otras importadas: Assaf, Lacaune (Awassi, Milchschaf)
- Reducción de nº de explotaciones. Inversión. Cooperativas
- El ovino de leche ha evolucionado mucho en pocas décadas y va a más

Castellana



Principales razas

Merino



Merino precoz



Churra



Manchega



Ille de France



Lacha cara negra



Segureña



Talaverana



Otros implicados



Referencias bibliográficas y enlaces web

- Acero Adámez, P. 2012. Planificación y manejo de la explotación de ovino de carne. Junta de Castilla y León. Valladolid.
<http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/321/447/ovino%20de%20carne%20web.pdf>
- Acero Adámez, P. 2012. Planificación y manejo de la explotación de ovino de leche. Junta de Castilla y León. Valladolid. http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/659/670/OV_LECHE.pdf
- Buxadé C. 1996. Producción ovina. Mundi-Prensa. Madrid
- Daza A. 1997. Reproducción y sistemas de explotación del ganado ovino. Mundi-Prensa. Madrid.
- Delgado LC, Gutiérrez P. 2012. Manual práctico de manejo de una explotación de ovino de carne. Junta de Castilla y León. Valladolid.
<http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/331/665/manual%20explotacion%20ovino%20carneop.pdf>
- Esteban Muñoz C. 2003. Razas ganaderas españolas ovinas. FEAGAS-MAPA. Madrid
- FEAGAS (Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto. 2012. Razas ovino.
<http://www.feagas.com/index.php/es/razas/especie-ovina>
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2012. Ganado ovino.
<http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-probadas/sistemas-prodnut-animal/ganado-ovino.aspx#para1>